Click to verify

إرشادات التهاب الغدة الدرقية المساريقيل

[illegible]

[illegible] أو نقص في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism). يؤدي الالتهاب إلى ظهور ألم وحساسية في منطقة الغدة. كما يمكن للالتهاب أن يؤدي الى فرط الدرقية (hyperthyroidism) أو نقص في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism). يؤدي انخفاض نشاط الغدة الدرقية الناجم عن عدوى جادة سواء كانت عدوى فيروسية أو بكتيرية إلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية في الرقبة. يتسبب الالتهاب في المراحل الأولى بإفراز مفرط لهرمون التيروكسين (hypothyroidism). العديد من الأعراض التي تختلف تبعًا لمسبب الالتهاب. إذ يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية (hyperthyroidism) أو نقص في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism). يتسبب الالتهاب في المراحل الأولى بإفراز مفرط لهرمون التيروكسين. يؤدي انخفاض نشاط الغدة الدرقية إلى الشعور بالبرد، وانخفاض معدل النبض وزيادة الوزن، يؤدي التهاب الغدة الدرقية الناجم عن عدوى حادة سواء كانت عدوى فيروسية أو بكتيرية إلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية في الرقبة. يتسبب الالتهاب في المراحل الأولى بإفراز مفرط لهرمون التيروكسين (hypothyroidism). العديد من الأعراض التي تختلف تبعًا لمسبب الالتهاب. إذ يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية (hyperthyroidism) أو نقص في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism).